



Formule douce

VÝHODY

- Odmašťuje a desinfikuje zároveň
- Bez EDTA, bez aldehydů
- Baktericidní, kvasinkocidní a virucidní účinnost
- Styk s potravinami



APLIKACE

SANICID® 5 DEGRAISSANT DESINFECTANT INODORE se používá pro čištění a desinfekci podlah a ploch v zemědělsko-potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. V souladu s legislativou týkající se čištění vybavení, které může přijít do styku s potravinami. Pro toto použití je opláchnutí pitnou vodou povinné. (Nařízení ze dne 08/09/99 pozměněné nařízením 19/12/13).

NÁVOD K POUŽITÍ

Zředte SANICID® 5 DDI od 0,25% do 2%.

Používejte způsobem vlhkého otírání nebo mytí podlah, příček, povrchů, nábytku a sanity.

Neoplachujte (s výjimkou případu styku s potravinami).

Zředěný přípravek lze skladovat až 7 dní v uzavřené lahvi a skladovat dle doporučení uvedených v bezpečnostním listu, jinak maximálně 24h.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled:	kapalina
Barva:	bezbarvá
Vůně:	bez vůně
Hustota:	= 1
pH prostředí:	slabá zásada

TYP PROSTŘEDKU

Desinfekce ploch (TP2-TP4)

Biocidní prostředky používejte s opatrností. Před použitím si přečtěte etiketu a informace týkající se prostředku.

ÚČINNÉ LÁTKY

Obsahuje:

Didecyldimethylamoniumchlorid - č. CAS 7173-51-5

- Koncentrace 15 % (m/m)

Benzalkoniumchlorid - č. CAS 68424-85-1

- Koncentrace 10 % (m/m)

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Baktericidní účinnost: EN 1276 (podmínky špíny – 0.5% – 5 min – 20°C), EN 13697 (podmínky špíny – 0.5% – 5 min – 20°C), NF EN 13727 (podmínky špíny – 0.5% – 5 min – 20°C), NF EN 14561 (podmínky špíny – 1% – 5 min – 20°C)

Kvasinkocidní účinnost: EN 1650 (podmínky špíny – 0.25% – 15 min – 20°C), EN 13697 (podmínky špíny – 0.25% – 15 min – 20°C), EN 13624 (podmínky špíny – 0.5% – 5 min – 20°C), NF EN 14562 (podmínky špíny – 0.5% – 15 min – 20°C)

Fungicidní účinnost: EN 1650 (podmínky špíny – 0.50% – 15 min – 20°C), EN 13697 (podmínky špíny – 2% – 15 min – 20°C)

Sporicidní účinnost: EN 13704 na Bacillus Subtilis a Clostridium difficile (podmínky čistoty – 5% – 60 min – 20°C)

Virucidní účinnost: EN 14476 kompletně na Norovirus, Poliovirus a Adenovirus (podmínky špíny – 2% – 15 min – 20°C), Coronavirus a Papillomavirus (podmínky špíny – 2% – 15 min – 20°C), PRV*, BVDV* a H1N1 (podmínky špíny – 2% – 5 min – 20°C), Herpès, Vaccinia virus a Rotavirus (podmínky špíny – 0.5% – 5 min – 20°C), HIV (podmínky špíny – 2% – 60 s – 20°C)

* Swine Pseudorabies Virus (PRV) a Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) jsou substituty pro HBV (Hepatitis B) a HCV (Hepatitis C).

BALENÍ

Kanýstr 5L

Ref. LB922610

BEZPEČNOST

Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití. Před použitím se ujistěte, že je nezbytné, zejména v místech frekventovaných širokou veřejností. Pokud je to možné, upřednostněte alternativní metody a prostředky představující nižší riziko pro zdraví člověka, zvířat a pro životní prostředí. Pro více informací konzultujte bezpečnostní list.